FLUMITE 200 SC

20 % Diflovidazine

Présentation du produit

- **Nom Commercial** : FLUMITE 200 SC
- **Classe du produit** : Acaricide
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : E01-02-002
- **Type de formulation** : Suspension concentrée (SC)
- **Composition chimique :** 20 % Diflovidazine
- **Mode d'action :** Contact, Ingestion, Translaminaire, Vapeur
- **Site d'action :** Action de contact et translaminaire sur les œufs et inhibe la formation de chrysalide.

Efficacité

Culture	Ravageur visé	Dose
Pommier	*Œufs d'hiver* *Œufs d'été et larves*	50 cc/hl 35 cc/hl en mélange
Pêcher	*Œufs d'hiver* *Œufs d'été et larves*	50 cc/hl 35 cc/hl en mélange
Vigne	*Œufs d'hiver* *Œufs d'été et larves*	50 cc/hl 35 cc/hl en mélange
Tomate, Maraichage	*Acariens nuisibles*	35 cc/hl
Cucurbitacées	*Acariens nuisibles*	35 cc/hl

Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi :** Par voie foliaire
- **Période d'emploi :**

  Sur vigne : Contre *Caleptrimerus Vitis,* Flumite 200 SC peut être appliqué soit
  - depuis le débourrement jusqu'au stade 2-3 feuilles
  - Au stades jeunes du bourgeon
  - ou au stade grappes fermés

  Contre *Panonychus ulmi l'*application du produit doit être entre le débourrement et le stade 2-3 feuilles.

  Sur pommier : Contre *Panonychus ulmi* Traiter avec Flumite 200 SC :
  - Au stade D-D3 (bouton florale) avant l'éclosion des œufs.
  - Au début du stade J(croissance du fruit) qui coïncide avec la période de dépôt des œufs par la femelle.
  - Au stade J (croissance du fruit)

  Contre *tetranychus urticae :* Les traitements s'effectuent en fin floraison et au début de la croissance du fruit (stade J)

- **Conditionnement :** 1 Litre, 350 cc et 100 cc

AGRO SPRAY TECHNIC, Lot N° 28, Quartier Industriel de Takkadoum- Rabat- Tél :+212.37.63.84.32/75 - Fax :+212.37.63.85.37-
E-mail : ast@agrospraytechnic.ma